

★最重症合併妊産婦調査 総括

1. 最重症妊産婦発生数

	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013-2018	
	(半年) 平成22年 (半年)	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	6年間	平均
最重症妊産婦発生数	198	392	406	450	398	372	427	2,445	408
最重症妊産婦の発生率 (分数表示)	0.53%	0.54%	0.58%	0.64%	0.58%	0.56%	0.65%	0.59%	0.59%
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	190	184	172	157	173	179	153	169	169

2. 転帰

	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013-2018
治癒・寛解・軽快	188	371	395	447	378	362	417 (97.7%)	2,370
不変	4	13	5	1	10	5	5 (1.2%)	39
悪化	2	1	0	0	2	1	0 (0.0%)	4
死亡	2	5	2	1	3	3	2 (0.5%)	16
不明	2	2	4	1	5	1	3 (0.7%)	16
後遺症あり				4	5	5	3 (0.7%)	17
	198	392	406	450	398	372	427	2,445

3. 最重症妊産婦の死亡率

	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013-2018
最重症妊産婦の死亡率	1.0%	1.3%	0.5%	0.2%	0.8%	0.8%	0.5%	0.7%
最重症妊産婦の死亡率 (分数表示)	1	1	1	1	1	1	1	1
	99	78	203	450	133	124	214	153
最重症受入施設			0.0%	0.5%	0.0%	0.6%	0.8%	
非最重症受入施設			0.8%	0.0%	1.9%	1.0%	事例なし	

(参考) 妊産婦死亡率 と 数

大阪 妊産婦死亡率 (/10万) : (本調査より)	2.7	6.9	2.9	1.4	4.4	4.5	3.1	3.9
大阪 妊産婦死亡数 :人口動態統計・e-Statより	3	5	1	1	4	0	3	-
大阪 妊産婦死亡率 (/10万) :人口動態統計・e-Statより	3.9	6.8	1.4	1.4	5.7	0.0	4.5	-
全国 妊産婦死亡率 (/10万) :人口動態統計・e-Statより	4.1	3.4	2.7	3.8	3.4	3.4	3.3	-

使用した分母

年	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013-2018
*出生総数	75,080	72,054	69,968	70,596	68,816	66,602	65,446	413,482

4. 心肺停止症例 6例

最終診断	発症時期	発生場所	搬入先	転帰
① 詳細不明	妊娠39週	自宅(救急車)	最重症妊産婦受入施設	寛解
② HELLP症候群、脳出血	産褥0日	1次施設	最重症妊産婦受入施設	死亡
③ 癒着胎盤	分娩時(妊婦)	最重症妊産婦受入施設		完治
④ 産後アルコール中毒	産褥29日目	自宅(救急車)	最重症妊産婦受入施設	寛解
⑤ 常位胎盤早期剥離	妊娠34週	1次施設	最重症妊産婦受入施設	完治
⑥ 肺高血圧症	妊娠34週	最重症妊産婦受入施設		死亡

5. 過去6年 死亡症例 (大阪) 2013-2018

		死亡	2013-18	死亡率	
		症例数	発生数		
直接産科原因 (38%)	羊水塞栓	4	24	16.7%	
	弛緩出血	1	519	0.2%	
	常位胎盤早期剥離	2	235	0.9%	
	子癇	1	87	1.1%	38.1%
間接産科原因 (52%)	てんかん	2	11	18.2%	
	心血管	4	66	6.1%	
	血液疾患	2	11	18.2%	
	中枢疾患	1	68	1.5%	
	敗血症	1	38	2.6%	
自殺・偶発 (5%)	がん	1	8	12.5%	52.4%
	脊椎麻酔 自殺	1			9.5%