

〈令和7年11月30日までのデータ〉

オオタバコガ フェロモントラップ


蛾のオス成虫がメス成虫の出す性フェロモンに誘引される特徴を利用して発生量を調査しています。
誘殺虫数が平年より著しく増加した場合、その後に幼虫が多発して被害を受けることがあります。

オオタバコガは、きく、トマト、水なす、キャベツなど野菜・花き類全般を加害します。


〈調査地点〉羽曳野市、枚方市、八尾市、富田林市、岸和田市、泉佐野市

誘殺虫数(旬別) ※縦軸の目盛りはグラフごとに異なる場合がありますのでご注意ください。

羽曳野	4			5			6			7			8			9			10			11		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R7	1	5	30	76	58	65	12	33	163	138	119	80	69	27	22	70	46	134	218	217	131	59	17	2
平年値	0	1	3	12	10	7	3	11	38	32	26	31	25	20	22	23	37	53	66	63	49	22	14	3




枚方	4			5			6			7			8			9			10			11		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R7				16	19	32	7	22	56	89	32	26	40	21	24	58	62	97	101	110	66	30	9	2
平年値				3	3	1	1	4	8	10	6	9	10	9	12	13	8	20	21	18	14	12	11	2




〈令和7年11月30日までのデータ〉


八尾	4			5			6			7			8			9			10			11		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R7				29	71	68	13	73	152	158	107	108	109	90	82	49	64	96	120	120	111	57	35	1
平年値				5	28	13	11	33	66	82	63	80	78	57	53	56	63	67	69	66	66	24	37	14



富田林	4			5			6			7			8			9			10			11		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R7				4	2	1	0	1	0	0	0	0	4	7	5	3	3	3	25	17	7	1	2	0
平年値				3	3	3	5	3	3	3	2	2	1	3	1	2	2	3	13	4	5	3	0	1



岸和田	4			5			6			7			8			9			10			11		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R7				110	213	131	43	51	84	89	60	37	89	36	32	73	59	96	129	143	185	163	73	34
平年値				20	17	15	14	30	56	65	49	48	32	34	28	37	47	54	67	77	84	68	47	21



〈令和7年11月30日までのデータ〉

泉佐野	4			5			6			7			8			9			10			11		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
R7				47	53	21	10	69	162	175	113	91	96	70	75	105	65	89	150	74	127	78	44	20
平年値				13	15	13	8	32	66	73	54	61	62	52	44	55	71	75	79	84	97	67	39	17

