

表 2 - 1 4 降下ばいじん総量（年平均値）の推移

(1) 大阪市地域

(単位：トン／月／㎥)

年度 地区	昭46	54	55	56	57	58	備 考
西部地区	14.69	8.73	9.00	5.81	5.06	4.71	大正、此花、西淀川、住之江の4区
北部地区	8.48	4.63	5.18	3.63	3.54	2.85	淀川、東淀川、城東、旭の4区
中心部地区	7.80	6.20	6.52	4.08	4.09	3.29	北、西、西成の3区
南部地区	9.10	5.73	6.24	3.55	3.42	3.16	生野、平野の2区
全市平均	10.85	6.76	7.12	4.56	4.26	3.72	

(注) ダストジャーによる測定である。

(2) 堺市地域

(単位：トン／月／㎥)

年度 地区	昭46	54	55	56	57	58	備 考
西部地区	10.18	5.94	6.04	4.43	4.54	5.39	国鉄阪和線以西の地区
東部地区	6.60	3.86	3.70	3.16	3.35	3.95	国鉄阪和線以东の地区
全市平均	8.82	5.25	5.24	3.98	4.11	4.85	

(注) 昭和53年度以前においては、簡易ばいじんびんによる測定のため、ダストジャーによる測定と比較できるように、その測定値の2分の1の値を掲げた。昭和54年度以降においては、ダストジャーによる測定である。

(3) その他の地域

(単位：トン／月／㎥)

年度 地区	昭46	54	55	56	57	58	備 考
池田市	5.48	2.79	2.59	2.58	2.50	2.45	池田保健所
豊中市	6.09	3.52	2.96	2.25	2.39	2.28	豊中保健所
吹田市	7.35	4.17	3.91	3.30	3.27	3.24	吹田保健所
守口市	6.60	3.53	3.67	2.71	3.11	2.74	守口保健所
東大阪市	7.83	4.07	3.68	2.93	3.07	2.85	東大阪市西保健所(旧布施保健所)
八尾市	10.23	4.97	4.20	3.48	3.91	4.02	八尾保健所
松原市	6.79	3.81	3.34	2.82	3.87	3.95	大阪薬科大学

(注) ダストジャーによる測定である。