

薬剤師・登録販売者の皆さま

医薬品の適正販売により、市販薬の乱用を防止しましょう！

濫用のおそれのある医薬品

以下に掲げるもの、その水和物及びそれら塩類を有効成分として含有する製剤

- ・エフェドリン
- ・ブロモバレリル尿素
- ・コデイン
- ・プソイドエフェドリン
- ・ジヒドロコデイン
- ・メチルエフェドリン


※「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十五条の二の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」の改正について（令和5年2月8日付薬生発0208第1号）

濫用のおそれのある医薬品の販売時の確認事項

- 若年者が購入しようとする場合は、**氏名及び年齢**
- 他の薬局、店舗等での濫用等のおそれのある医薬品の **購入状況**
- 適正使用のために必要な数量（原則として1包装単位）
を超えて購入しようとする場合は、その **理由**



※薬機法施行規則第15条の2、第147条の3


 相談できる窓口



©2014 大阪府もずやん

市販薬の乱用の実態を知ろう！

市販薬の乱用経験者数は



約 **65 万人**



と推計されています


※令和5年度薬物乱用・依存状況の実態把握のための全国調査と近年の動向を踏まえた大麻等の乱用に関する研究・薬物使用に関する全国住民調査（2023年）



救急搬送された事例から

救急医療における薬物関連中毒症例に関する実態調査：一般用医薬品を中心に（2022年）

実際に、乱用に使用されているのは？



どのような中毒症状がでるの？

振戦や頭痛
意識障害
腹痛
嘔気嘔吐
イライラ
不整脈
不穏興奮
耳鳴り



乱用に使用されているのは
指定成分だけではない

▶ 救急搬送後、入院や集中治療室での治療を要した事例が多く、一部では残遺症状も確認されている

どうして、過量服用するの？

そのほかの目的 31%

- ・気分をあげたい
- ・元気をだしたい
- ・嫌なことを忘れたかった
- ・楽になりたいかった
- ・過量服用したくなる

自殺・自傷
74%

自傷の中には、特に死にたいというわけではないが
「いなくなりたい」
「自分を罰したい、傷つけたい」
といった意見も含まれていた

- 乱用に使用する市販薬の入手先は、**実店舗が最も多い**。
- お酒が買えないので市販薬を購入した等、手に入れにくい他の物の代用として市販薬が乱用されているといった声もある。



医薬品を販売する皆様の対策が、乱用の防止につながります！