

緊急度判断情報	◆第一印象	CPA
	◆<疾病・外因成人>重症感	気道の異常:気道の閉塞
		気道の狭窄
		いびき
		ゴロゴロ音
		気道異物
		口腔咽頭の浮腫
		呼吸の異常:会話不能～単語のみ
		過度の努力呼吸
		鼻翼呼吸
		起坐呼吸
		陥没呼吸
		腹式呼吸
		気管牽引
		チアノーゼ
		呼吸数<10
		SpO2<92%(酸素投与下)
		SpO2<90%(酸素投与なし)
		循環の異常:皮膚蒼白
		皮膚冷感
皮膚湿潤		
橈骨動脈触知不可		
高度の頻脈・徐脈		
制御不可能な外出血		
意識障害:JCS≥30		
急な意識レベル低下		
ヘルニア徴候		
体温の異常:明らかに熱い		
明らかに冷たい		
◆<疾病・外因成人>疼痛スコア	疼痛スコア8-10、急性	
	疼痛スコア8-10、慢性	
	疼痛スコア5-7、急性	
	疼痛スコア1-4、急性	
	疼痛スコア<8、慢性	
◆<疾病・外因成人>出血素因	先天性出血疾患	
	抗凝固薬の内服	
◆<疾病・外因成人>生理学的徴候	呼吸の異常:努力呼吸	
	とぎれとぎれの会話	
	吸気性喘鳴	
	SpO2<95%(酸素投与下)	
	SpO2<92%(酸素投与なし)	
	循環の異常:血圧<90mmHg	
	脈拍>120/分または<50/分	
	循環状態不安定	
	止血可能な外出血持続	
	意識障害:JCS2-20	
	GCS9-13	
	体温35℃以下	
	体温40℃以上	
	体温38℃以上で敗血症等の疑い	

緊急度判断情報	◆<疾病・外因小児>重症感	気道の異常:気道の閉塞 気道の狭窄 いびき ゴロゴロ音 気道異物 口腔咽頭の浮腫 呼吸の異常:会話不能～単語のみ 過度の努力呼吸 鼻翼呼吸 起坐呼吸 陥没呼吸 腹式呼吸 気管の牽引 チアノーゼ 呼吸数>80回/min.(～6カ月) 呼吸数>60回/min.(6カ月～1歳) 呼吸数>40回/min.(1歳～3歳) 呼吸数>30回/min.(3歳～6歳) 呼吸数>25回/min.(6歳以上) 呼吸数<10回/min. 呼吸:SpO2<92%(酸素投与下) 呼吸:SpO2<90%(酸素投与なし) 循環の異常:皮膚蒼白 皮膚冷感 皮膚湿潤 橈骨動脈触知不可 脈拍<40bpm.(～6歳) 脈拍<30bpm.(6歳～) 脈拍>210bpm.(～6カ月) 脈拍>180bpm.(6カ月～1歳) 脈拍>165bpm.(1歳～3歳) 脈拍>140bpm.(3歳～6歳) 脈拍>120bpm.(6歳以上) 制御不可能な外出血 意識障害:JCS≥30 急な意識レベル低下 ヘルニア徴候 体温の異常:明らかに熱い 明らかに冷たい
	◆<疾病・外因小児>疼痛スコア・外観	疼痛スコア8-10、急性 不機嫌 周囲への反応性低下 顔色不良
	◆<疾病・外因小児>既往歴	先天性疾患(凝固異常、免疫不全)
	◆<疾病・外因小児>生理学的徴候	呼吸の異常:努力呼吸 とぎれとぎれの会話 吸気性喘鳴 SpO2<95%(酸素投与下) SpO2<92%(酸素投与なし) 循環の異常:循環状態が不安定 止血可能な外出血持続 意識障害:JCS2-20 GCS9-13 体温35℃以下 体温40℃以上 体温37.5℃以上で敗血症等の疑い
◆<外因基本>原因	農薬服用 アスピリン大量服用 アセトアミノフェン大量服用 血糖降下薬大量服用 強酸服用 強アルカリ服用 石油製品服用 青酸化合物服用 防虫剤、殺鼠剤服用 毒性のある食物服用	

緊急度判断情報	◆<外傷基本>生理学的評価	気道の異常:気道の閉塞 気道の狭窄 いびき ゴロゴロ音 気道異物 口腔咽頭の浮腫 呼吸の異常:会話不能～単語のみ 過度の努力呼吸 鼻翼呼吸 陥没呼吸 腹式呼吸 気管の牽引 チアノーゼ 呼吸数<10 SpO2<92%(酸素投与下) SpO2<90%(酸素投与なし) 循環の異常:皮膚蒼白 皮膚冷感 皮膚湿潤 橈骨動脈触知不可 頻脈(>120)または徐脈(<50) 制御不可能な外出血 意識障害:JCS \geq 30またはGCS \leq 8 急な意識レベル低下 ヘルニア徴候 痙攣の持続 体温の異常:明らかに熱い 明らかに冷たい 循環の異常:血圧<90mmHg 循環の異常:ショック徴候を認めた 循環状態が不安定 止血可能な外出血持続 65歳以上で血圧<110mmHg 意識障害:JCS2-20またはGCS9-13
	◆<外傷基本>解剖学的評価	頭部の開放骨折・陥没骨折 顔面頸部の高度な損傷 皮下気腫 外頸静脈の著しい怒張 呼吸音の左右差 胸郭の動揺・変形・フレイルチェスト 腹部膨隆、腹壁緊張 腰部骨盤部の激しい疼痛・圧痛 骨盤動揺 下肢長差 両側大腿骨骨折 頭頸部の穿通性外傷 体幹の穿通性外傷 大腿または上腕の穿通性外傷 挫滅創、デグロービング損傷 四肢動脈損傷 四肢切断・軀断 四肢の麻痺 15%以上の熱傷を合併した外傷 II度熱傷20%以上 III度熱傷10%以上 小児・高齢者II度熱傷10%以上 小児・高齢者III度熱傷5%以上 顔面熱傷、気道熱傷
	◆<外傷基本>受傷機転	自動車乗車中:同乗者死亡 車の横転 車外放出 車の高度損傷 バイクと運転者の距離大 車に跳ね飛ばされた 車に轢過された 高所墜落:成人>6m 小児>3m 機械器具に挟まれた 体幹部を挟まれた

緊急度判断情報	◆<外傷基本>患者背景	12歳以下 65歳以上 出血性素因 20週以降の妊婦 重症化しそうな印象 心疾患の既往 呼吸器疾患の既往 透析患者 肝疾患の既往 糖尿病の既往 薬物中毒合併
	◆<医療機関選定理由>	疾病・外因・外傷:実施基準に従った 実施基準に従わなかった 救急隊判断:依頼搬送 府外直近 患者容態で判断 転院 その他 脳血管疾患 吐下血・消化管出血(疑い含む) 循環器疾患 呼吸器疾患 循環器疾患(ACS) 急性腹症(疑い含む) 四肢外傷 四肢以外の外傷 外傷:Load&Goの適応あり 外傷:L&G適応:救命救急センターへ搬送 それ以外医療機関へ搬送 理由:依頼搬送 圏外直近 患者容態で判断 オンラインMC指示 外傷:実施基準に従った 実施基準に従わなかった 理由:依頼搬送 圏外直近 患者容態で判断 その他
疾病:成人	◆呼吸困難	突然発症し、数分以上続く胸痛 境界不明瞭な胸痛 心電図上ST-T変化 心電図上wideQRS 心電図上の不整脈 心疾患の既往 頸静脈の怒張 起座呼吸かつ喘鳴 起座呼吸かつ四肢浮腫 起座呼吸かつ心不全の既往 起座呼吸かつ高血圧 喀血 広範囲ラ音 膿性痰・咳嗽・発熱 アレルギー・喘息・COPDの既往 著明な喘鳴 呼吸音の左右差 その他の呼吸困難
	◆胸痛	突然発症し、数分以上続く胸痛 境界不明瞭な胸痛 心電図上ST-T変化 心電図上wideQRS 心電図上の不整脈 心疾患の既往 高度な呼吸困難 突然発症の背部の激痛を伴う 移動する背部痛 足背動脈の減弱 上肢の血圧左右差 その他の胸痛
	◆動悸	ショック状態 意識消失あり 致死的不整脈の既往 突然発症し、数分以上続く胸痛を伴う 境界不明瞭な胸痛を伴う 心電図上ST-T変化 心電図上wideQRS 心電図上の不整脈 心疾患の既往 その他の動悸

疾病：成人	◆腹痛	突然発症の激しい腹痛 反跳痛や筋性防御を伴う 拍動性の腫瘍を触知 高度貧血 経膈出血 妊娠中 その他の腹痛
	◆吐下血	新鮮な吐下血 24時間以内の大量吐下血 高度貧血を伴う吐下血 その他の吐下血
	◆下痢	下痢
	◆嘔吐・嘔気	頭痛やめまいを伴う 片側上肢・下肢の運動麻痺 片側顔面の運動麻痺 片側のしびれ感 失語症・構音障害 片側の失明 運動失調 その他の嘔吐・嘔気
	◆産婦人科疾患	妊婦の腹痛 妊婦の意識障害・けいれん 妊婦の呼吸困難 妊婦の性器出血 婦人科関連の症状
	◆血尿・側腹部痛	血尿・側腹部痛
	◆泌尿器科疾患	下腹・会陰の発赤、腫脹、握雪感 睾丸の激しい疼痛 その他の泌尿器関連の症状
	◆腰背部痛	急激な発症 痛みが移動する 上肢血圧の左右差 足背動脈触知微弱 拍動する腹部腫瘍 その他の腰背部痛
	◆急性発症の意識障害	これまでで最悪の頭痛 視力障害を伴う 片側上肢・下肢の運動麻痺 片側顔面の運動麻痺 片側のしびれ感 失語症・構音障害 片側の失明 運動失調 突然発症し、数分以上続く胸痛を伴う 境界不明瞭な胸痛を伴う 心電図上ST-T変化 心電図上wideQRS 心電図上の不整脈 心疾患の既往 その他の意識障害
	◆急性発症の頭痛	これまでで最悪の頭痛 視力障害を伴う 片側上肢・下肢の運動麻痺 片側顔面の運動麻痺 片側のしびれ感 失語症・構音障害 片側の失明 運動失調 その他の頭痛
◆急性発症のしびれ・麻痺	片側上肢・下肢の運動麻痺 片側顔面の運動麻痺 片側のしびれ感 失語症・構音障害 片側の失明 運動失調 その他のしびれ・麻痺	
◆痙攣	痙攣重責状態 痙攣が持続している 片側上肢・下肢の運動麻痺 片側顔面の運動麻痺 片側のしびれ感 失語症・構音障害 片側の失明 運動失調 これまでで最悪の頭痛 視力障害を伴う その他の痙攣	

疾病：成人	◆急性発症の眩暈・ふらつき	片側上肢・下肢の運動麻痺 片側顔面の運動麻痺 片側のしびれ感 失語症・構音障害 片側の失明 運動失調 突然発症し、数分以上続く胸痛を伴う 境界不明瞭な胸痛を伴う 心電図上ST-T変化 心電図上wideQRS 心電図上の不整脈 心疾患の既往 その他の眩暈・ふらつき
	◆その他の症状・徴候	片側上肢・下肢の運動麻痺 片側顔面の運動麻痺 片側のしびれ感 失語症・構音障害 片側の失明 運動失調 突然発症し、数分以上続く胸痛を伴う 境界不明瞭な胸痛を伴う 心電図上ST-T変化 心電図上wideQRS 心電図上の不整脈 心疾患の既往 その他の症状・徴候
疾病：小児	◆呼吸困難	喘鳴 呼吸音の異常 呼吸音の左右差 その他の呼吸困難
	◆意識障害	その他の意識障害
	◆頭痛	突然発症の激しい頭痛 その他の頭痛
	◆腹痛	急性の激しい腹痛 腹壁緊張または圧痛 腹膜刺激徴候 高度貧血 グル音消失 金属製グル音 吐下血 腹部の異常膨隆 頻回の嘔吐 その他の腹痛
	◆腰痛	しびれ・麻痺を伴う 膀胱直腸障害 その他の腰痛
	◆胸痛	不整脈の既往 冠動脈瘤(川崎病)の既往 動悸を伴う その他の胸痛
	◆しびれ・麻痺	その他のしびれ・麻痺
	◆痙攣	痙攣が持続している 痙攣重責状態 痙攣が収まっている
	◆嘔気・嘔吐	頻回 胆汁様 口腔・舌の乾燥 ソルゴール低下 尿量減少 その他の嘔気・嘔吐
	◆下痢	口腔・舌の乾燥 ソルゴール低下 尿量減少 その他の下痢
	◆発熱(37.5℃以上)	3ヵ月以下 3歳以下で具合が悪そう その他の発熱
◆その他の症状・徴候	その他の症状・徴候	

外因：成人小児	◆有毒ガス吸引	症状の有無にかかわらず 身体症状あり 身体症状なし
	◆覚醒剤・麻薬中毒	症状の有無にかかわらず 精神症状のあるもの 精神症状なし
	◆化学物質暴露・化学損傷	皮膚(化学損傷) 粘膜症状 呼吸器症状 症状なし
	◆電撃傷	一過性の意識障害 不整脈 胸痛 運動麻痺・脱力 しびれ・感覚麻痺 Ⅲ度以上の電撃熱傷 症状なし
	◆生物による咬傷・刺傷	大関節を超える発赤腫脹 アナフィラキシー徴候 マムシ咬傷疑い 症状なし
	◆寒冷暴露・低体温	意識障害(無関心・錯乱・昏睡) 除脈・不整脈 心電図波形の延長・J波 筋硬直 四肢末梢の冷感、蒼白、壊死 症状なし
	◆高温暴露・高体温	意識障害 小脳症状 痙攣発作 出血傾向、紫斑 頭痛 嘔吐 倦怠感、虚脱感 集中力・判断力の低下 めまい 欠神 筋硬直(こむら返り) 大量の発汗 筋肉痛
	◆溺水	症状の有無に関わらず
	◆異物誤飲	喘鳴 呼吸音の異常 呼吸音の左右差 腐食性(ボタン電池等) 鋭利なもの 中毒性物質(タバコ等) 上記全てに該当しない
	◆潜水病・減圧症	呼吸器症状 関節痛 神経障害 症状なし
	◆医薬品大量服用	傾眠 不整脈 呼吸抑制 高体温 低血圧 筋硬直 症状なし
	◆その他の中毒	身体症状あり 身体症状なし
	◆原因毒物不明	身体症状あり 身体症状なし

外傷：成人小児	◆眼球損傷・眼窩周辺骨折	視力障害 複視 眼球偏位 眼球脱出 その他の眼外傷
	◆四肢外傷（13歳以上）	激しい疼痛 変形 腫脹 嚙音 開放創を伴う激しい疼痛 開放創を伴う変形 開放創を伴う腫脹 開放創を伴う嚙音 その他の四肢外傷
	◆四肢外傷（12歳以下）	変形 腫脹 嚙音 手足を動かさない その他の四肢外傷
	◆手指・足趾切断	手指・足趾切断
	◆頭部外傷（13歳以上）	失見当識 瞳孔異常 髄液鼻(耳)漏 バトルサイン パンダの目 激しい鼻出血 耳出血 頻回の嘔吐 症状なしまたは頭部打撲・挫創・皮下血腫のみ 失見当識 瞳孔異常 髄液鼻(耳)漏 バトルサイン パンダの目 激しい鼻出血 耳出血 頻回の嘔吐 症状なしまたは頭部打撲・挫創・皮下血腫のみ
	◆その他の損傷	損傷の如何にかかわらず