

区分	階層1	階層2
	◆C P A	C P A 気道の異常:気道の閉塞 気道の異常:いびき 気道の異常:ゴロゴロ音 気道の異常:気道異物 気道の異常:口腔咽頭の浮腫 呼吸の異常:会話不能～単語のみ 呼吸の異常:過度の努力呼吸 呼吸の異常:鼻翼呼吸 呼吸の異常:起坐呼吸 呼吸の異常:陥没呼吸 呼吸の異常:腹式呼吸 呼吸の異常:気管牽引 呼吸の異常:チアノーゼ 呼吸の異常:呼吸数<10 呼吸の異常:SpO2<92% (酸素投与下) 呼吸の異常:SpO2<90% (酸素投与なし) 循環の異常:皮膚蒼白 循環の異常:皮膚冷感 循環の異常:皮膚湿潤 循環の異常:橈骨動脈触知不可 循環の異常:高度の頻脈・徐脈 循環の異常:制御不可能な外出血 意識障害:JCS ≥ 30 意識障害:急な意識レベル低下 意識障害:ヘルニア徵候 体温の異常:明らかに熱い 体温の異常:明らかに冷たい
緊急度判断情報	◆<疾病・外因成人>疼痛スコア	疼痛スコア8-10、急性 疼痛スコア8-10、慢性 疼痛スコア5-7、急性 疼痛スコア1-4、急性 疼痛スコア<8、慢性
	◆<疾病・外因成人>出血素因	先天性出血疾患 抗凝固薬の内服
	◆<疾病・外因成人>生理学的徵候	呼吸の異常:努力呼吸 呼吸の異常:とぎれとぎれの会話 呼吸の異常:吸気性喘鳴 呼吸の異常:SpO2<95% (酸素投与下) 呼吸の異常:SpO2<92% (酸素投与なし) 循環の異常:血圧 < 90mmHg 循環の異常:脈拍>120/分または<50/分 循環の異常:循環状態不安定 循環の異常:止血可能な外出血持続 意識障害:JCS2-20 意識障害:GCS9-13 体温35°C以下 体温40°C以上 体温38°C以上で敗血症等の疑い

区分	階層 1	階層 2
緊急度判断情報	◆<疾病・外因小児>重症感	気道の異常:気道の閉塞 気道の異常:気道の狭窄 気道の異常:いびき 気道の異常:ゴロゴロ音 気道の異常:気道異物 気道の異常:口腔咽頭の浮腫 呼吸の異常:会話不能～単語のみ 呼吸の異常:過度の努力呼吸 呼吸の異常:鼻翼呼吸 呼吸の異常:起坐呼吸 呼吸の異常:陥没呼吸 呼吸の異常:腹式呼吸 呼吸の異常:気管の牽引 呼吸の異常:チアノーゼ 呼吸の異常:呼吸数 > 80回/min.(～6カ月) 呼吸の異常:呼吸数 > 60回/min.(6カ月～1歳) 呼吸の異常:呼吸数 > 40回/min.(1歳～3歳) 呼吸の異常:呼吸数 > 30回/min.(3歳～6歳) 呼吸の異常:呼吸数 > 25回/min.(6歳以上) 呼吸の異常:呼吸数 < 10回/min. 呼吸の異常:呼吸:SpO2<92% (酸素投与下) 呼吸の異常:呼吸:SpO2<90% (酸素投与なし) 循環の異常:皮膚蒼白 循環の異常:皮膚冷感 循環の異常:皮膚湿潤 循環の異常:橈骨動脈触知不可 循環の異常:脈拍 < 40bpm.(～6歳) 循環の異常:脈拍 < 30bpm.(6歳～) 循環の異常:脈拍 > 210bpm.(～6カ月) 循環の異常:脈拍 > 180bpm.(6カ月～1歳) 循環の異常:脈拍 > 165bpm.(1歳～3歳) 循環の異常:脈拍 > 140bpm.(3歳～6歳) 循環の異常:脈拍 > 120bpm.(6歳以上) 循環の異常:制御不可能な外出血 意識障害:JCS ≥ 30 意識障害:急な意識レベル低下 意識障害:ヘルニア徵候 体温の異常:明らかに熱い 体温の異常:明らかに冷たい
	◆<疾病・外因小児>疼痛スコア・外観	疼痛スコア8-10、急性 不機嫌 周囲への反応性低下 顔色不良
	◆<疾病・外因小児>既往歴	先天性疾患(凝固異常、免疫不全)

区分	階層 1	階層 2
緊急度判断情報	<p>◆&lt;疾病・外因小児&gt;生理学的徵候</p>	呼吸の異常:努力呼吸 呼吸の異常:とぎれとぎれの会話 呼吸の異常:吸気性喘鳴 呼吸の異常:SpO2<95% (酸素投与下) 呼吸の異常:SpO2<92% (酸素投与なし) 循環の異常:循環状態が不安定 循環の異常:止血可能な外出血持続 意識障害:JCS2-20 意識障害:GCS9-13 体温35°C以下 体温40°C以上 体温37.5°C以上で敗血症等の疑い
	<p>◆&lt;外因基本&gt;原因</p>	農薬服用 アスピリン大量服用 アセトアミノフェン大量服用 血糖降下薬大量服用 強酸服用 強アルカリ服用 石油製品服用 青酸化合物服用 防虫剤、殺鼠剤服用 毒性のある食物服用
緊急度判断情報	<p>◆&lt;外傷基本&gt;生理学的評価</p>	気道の異常:気道の閉塞 気道の異常:気道の狭窄 気道の異常:いびき 気道の異常:ゴロゴロ音 気道の異常:気道異物 気道の異常:口腔咽頭の浮腫 呼吸の異常:会話不能～単語のみ 呼吸の異常:過度の努力呼吸 呼吸の異常:鼻翼呼吸 呼吸の異常:陥没呼吸 呼吸の異常:腹式呼吸 呼吸の異常:気管の牽引 呼吸の異常:チアノーゼ 呼吸の異常:呼吸数<10 呼吸の異常:SpO2<92% (酸素投与下) 呼吸の異常:SpO2<90% (酸素投与なし) 呼吸の異常:とぎれとぎれの会話 呼吸の異常:努力呼吸 呼吸の異常:重度吸気性喘鳴 呼吸の異常:SpO2<92% (酸素投与なし) 呼吸の異常:SpO2<95% (酸素投与下) 循環の異常:皮膚蒼白 循環の異常:皮膚冷感 循環の異常:皮膚湿潤

区分	階層 1	階層 2
	<p>◆&lt;外傷基本&gt;生理学的評価</p>	循環の異常:橈骨動脈触知不可 循環の異常:頻脈(> 120)または徐脈(< 50) 循環の異常:制御不可能な外出血 循環の異常: 血圧<90mmHg 循環の異常: ショック徵候を認めた 循環の異常: 循環状態が不安定 循環の異常: 止血可能な外出血持続 循環の異常: 65歳以上で血圧<110mmHg 意識障害:JCS $\geq$ 30またはGCS $\leq$ 8 意識障害:急な意識レベル低下 意識障害:ヘルニア徵候 意識障害:痙攣の持続 意識障害:JCS2-20またはGCS9-13 体温の異常:明らかに熱い 体温の異常:明らかに冷たい
緊急度判断情報	<p>◆&lt;外傷基本&gt;解剖学的評価</p>	頭部の開放骨折・陥没骨折 顔面頸部の高度な損傷 皮下気腫 外頸静脈の著しい怒張 呼吸音の左右差 胸郭の動搖・変形・フレイルチェスト 腹部膨隆、腹壁緊張 腰部骨盤部の激しい疼痛・圧痛 骨盤動搖 下肢長差 両側大腿骨骨折 頭頸部の穿通性外傷 体幹の穿通性外傷 大腿または上腕の穿通性外傷 挫滅創、デグローピング損傷 四肢動脈損傷 四肢切断・斬断 四肢の麻痺 15%以上の熱傷を合併した外傷 II度熱傷20%以上 III度熱傷10%以上 小児・高齢者 II度熱傷10%以上 小児・高齢者 III度熱傷5%以上 顔面熱傷、気道熱傷
	<p>◆&lt;外傷基本&gt;受傷機転</p>	自動車乗車中: 同乗者死亡 自動車乗車中: 車の横転 自動車乗車中: 車外放出 自動車乗車中: 車の高度損傷 バイクと運転者の距離大 車に跳ね飛ばされた 車に轢過された 高所墜落: 成人 > 6m 高所墜落: 小児 > 3m 機械器具に挟まれた 体幹部を挟まれた

区分	階層 1	階層 2
	◆<外傷基本>患者背景	12歳以下 65歳以上 出血性素因 20週以降の妊婦 重症化しそうな印象 心疾患の既往 呼吸器疾患の既往 透析患者 肝疾患の既往 糖尿病の既往 薬物中毒合併
緊急度判断情報	◆<医療機関選定理由>	疾病・外因・外傷：実施基準に従った 疾病・外因・外傷：実施基準に従わなかった 救急隊判断：依頼搬送 救急隊判断：府外直近 救急隊判断：患者容態で判断 救急隊判断：転院 救急隊判断：その他 救急隊判断：脳血管疾患 救急隊判断：吐下血・消化管出血（疑い含む） 救急隊判断：呼吸器疾患 救急隊判断：循環器疾患(ACS) 救急隊判断：循環器疾患(ACS以外) 救急隊判断：急性腹症（疑い含む） 救急隊判断：四肢外傷 救急隊判断：四肢以外の外傷 救急隊判断：外傷：Load&Goの適応あり
疾病：成人	◆呼吸困難	突然発症し、数分以上続く胸痛 境界不明瞭な胸痛 心電図上ST-T変化 心電図上wideQRS 心電図上の不整脈 心疾患の既往 頸静脈の怒張 起座呼吸かつ喘鳴 起座呼吸かつ四肢浮腫 起座呼吸かつ心不全の既往 起座呼吸かつ高血圧 咳血 広範囲ラ音 膿性痰・咳嗽・発熱 アレルギー・喘息・COPDの既往 著明な喘鳴 呼吸音の左右差 その他の呼吸困難

区分	階層 1	階層 2
疾病：成人	◆胸痛	突然発症し、数分以上続く胸痛
		境界不明瞭な胸痛
		心電図上ST-T変化
		心電図上wideQRS
		心電図上の不整脈
		心疾患の既往
		高度な呼吸困難
		突然発症の背部の激痛を伴う
		移動する背部痛
		足背動脈の減弱
疾病：成人	◆動悸	上肢の血圧左右差
		その他の胸痛
		ショック状態
		意識消失あり
		致死的不整脈の既往
		突然発症し、数分以上続く胸痛を伴う
		境界不明瞭な胸痛を伴う
		心電図上ST-T変化
		心電図上wideQRS
		心電図上の不整脈
疾病：成人	◆腹痛	心疾患の既往
		その他の動悸
		突然発症の激しい腹痛
		反跳痛や筋性防御を伴う
		拍動性の腫瘤を触知
		高度貧血
		経膣出血
		妊娠中
		その他の腹痛
		新鮮な吐下血
疾病：成人	◆吐下血	24時間以内の大量吐下血
		高度貧血を伴う吐下血
		その他の吐下血
		下痢
	◆下痢	頭痛やめまいを伴う
		片側上肢・下肢の運動麻痺
		片側顔面の運動麻痺
		片側のしびれ感
		失語症・構音障害
		片側の失明
		運動失調
		その他の嘔吐・嘔気
疾病：成人	◆嘔吐・嘔気	妊娠の腹痛
		妊娠の意識障害・けいれん
		妊娠の呼吸困難
		妊娠の性器出血
		婦人科関連の症状

区分	階層 1	階層 2
疾病：成人	◆血尿・側腹部痛	血尿・側腹部痛
		下腹・会陰の発赤、腫脹、握雪感
	◆泌尿器科疾患	睾丸の激しい疼痛
		その他の泌尿器関連の症状
	◆腰背部痛	急激な発症
		痛みが移動する
		上肢血圧の左右差
		足背動脈触知微弱
		拍動する腹部腫瘍
		その他の腰背部痛
	◆急性発症の意識障害	これまでで最悪の頭痛
		視力障害を伴う
		片側上肢・下肢の運動麻痺
		片側顔面の運動麻痺
		片側のしびれ感
		失語症・構音障害
		片側の失明
		運動失調
		突然発症し、数分以上続く胸痛を伴う
		境界不明瞭な胸痛を伴う
		心電図上ST-T変化
		心電図上wideQRS
		心電図上の不整脈
		心疾患の既往
		その他の意識障害
	◆急性発症の頭痛	これまでで最悪の頭痛
		視力障害を伴う
		片側上肢・下肢の運動麻痺
		片側顔面の運動麻痺
		片側のしびれ感
		失語症・構音障害
		片側の失明
	◆急性発症のしびれ・麻痺	運動失調
		その他の頭痛
		片側上肢・下肢の運動麻痺
		片側顔面の運動麻痺
		片側のしびれ感
		失語症・構音障害
		片側の失明
	◆痙攣	運動失調
		その他のしびれ・麻痺
		痙攣重責状態
		痙攣が持続している
		片側上肢・下肢の運動麻痺
		片側顔面の運動麻痺
		片側のしびれ感
		失語症・構音障害
		片側の失明
		運動失調

区分	階層 1	階層 2
疾病：成人	◆急性発症の眩暈・ふらつき	片側上肢・下肢の運動麻痺 片側顔面の運動麻痺 片側のしびれ感 失語症・構音障害 片側の失明 運動失調 突然発症し、数分以上続く胸痛を伴う 境界不明瞭な胸痛を伴う 心電図上ST-T変化 心電図上wideQRS 心電図上の不整脈 心疾患の既往 その他の眩暈・ふらつき
	◆その他の症状・徵候	片側上肢・下肢の運動麻痺 片側顔面の運動麻痺 片側のしびれ感 失語症・構音障害 片側の失明 運動失調 突然発症し、数分以上続く胸痛を伴う 境界不明瞭な胸痛を伴う 心電図上ST-T変化 心電図上wideQRS 心電図上の不整脈 心疾患の既往 その他の症状・徵候
疾病：小児	◆呼吸困難	喘鳴 呼吸音の異常 呼吸音の左右差 その他の呼吸困難
	◆意識障害	その他の意識障害
	◆頭痛	突然発症の激しい頭痛 その他の頭痛
	◆腹痛	急性の激しい腹痛 腹壁緊張または圧痛 腹膜刺激徵候 高度貧血 グル音消失 金属製グル音 吐下血 腹部の異常膨隆 頻回の嘔吐 その他の腹痛
	◆腰痛	しびれ・麻痺を伴う 膀胱直腸障害 その他の腰痛

区分	階層 1	階層 2
疾病：小児	◆胸痛	不整脈の既往
		冠動脈瘤(川崎病)の既往
		動悸を伴う
		その他の胸痛
	◆しびれ・麻痺	その他のしびれ・麻痺
		痙攣が持続している
		痙攣重責状態
	◆嘔気・嘔吐	痙攣が収まっている
		頻回
		胆汁様
		口腔・舌の乾燥
		ツルゴール低下
		尿量減少
	◆下痢	その他の嘔気・嘔吐
		口腔・舌の乾燥
		ツルゴール低下
		尿量減少
	◆発熱(37.5°C以上)	その他の下痢
		3ヵ月以下
		3歳以下で具合が悪そう
	◆その他の症状・徵候	その他の発熱
		その他の症状・徵候
外因：成人・小児	◆有毒ガス吸引	身体症状あり
		身体症状なし
	◆覚醒剤・麻薬中毒	精神症状のあるもの
		精神症状なし
	◆化学物質暴露・化学損傷	皮膚（化学損傷）
		粘膜症状
		呼吸器症状
		症状なし
	◆電撃傷	一過性の意識障害
		不整脈
		胸痛
		運動麻痺・脱力
		しびれ・感覚麻痺
		III度以上の電撃熱傷
		症状なし
	◆生物による咬傷・刺傷	大関節を超える発赤腫脹
		アナフィラキシー徵候
		マムシ咬傷疑い
		症状なし
	◆寒冷暴露・低体温	意識障害（無関心・錯乱・昏睡）
		徐脈・不整脈
		心電図波形の延長・J波
		筋硬直
		四肢末梢の冷感、蒼白、壞死
		症状なし

区分	階層 1	階層 2
外因：成人・小児	◆高温暴露・高体温 ◆溺水 ◆異物誤飲 ◆潜水病・減圧症 ◆医薬品大量服用 ◆その他の中毒 ◆原因毒物不明	意識障害 小脳症状 痙攣発作 出血傾向、紫斑 頭痛 嘔吐 倦怠感、虚脱感 集中力・判断力の低下 めまい 欠神 筋硬直（こむら返り） 大量の発汗 筋肉痛 症状の有無に関わらず 喘鳴 呼吸音の異常 呼吸音の左右差 腐食性（ボタン電池等） 鋭利なもの 中毒性物質（タバコ等） 上記全てに該当しない 呼吸器症状 関節痛 神経障害 症状なし 傾眠 不整脈 呼吸抑制 高体温 低血圧 筋硬直 症状なし 身体症状あり 身体症状なし 身体症状あり 身体症状なし
		視力障害
		複視
		眼球偏位
		眼球脱出
		他の眼外傷
		激しい疼痛
		変形
		腫脹
		轢音
外傷：成人・小児	◆眼球損傷・眼窩周辺骨折 ◆四肢外傷（13歳以上）	開放創を伴う激しい疼痛 開放創を伴う変形 開放創を伴う腫脹 開放創を伴う轢音 他の四肢外傷

区分	階層 1	階層 2
外傷：成人・小児	◆四肢外傷（12歳以下）	変形
		腫脹
		轢音
		手足を動かさない
		その他の四肢外傷
	◆手指・足趾切断	手指・足趾切断
		失見当識
		瞳孔異常
		髄液鼻（耳）漏
		バトルサイン
◆頭部外傷（13歳以上）	パンダの目	
	激しい鼻出血	
	耳出血	
	頻回の嘔吐	
	症状なしまたは頭部打撲・挫創・皮下血腫のみ	
◆頭部外傷（12歳以下）	失見当識	
	瞳孔異常	
	髄液鼻（耳）漏	
	バトルサイン	
	パンダの目	
◆その他の損傷	激しい鼻出血	
	耳出血	
	頻回の嘔吐	
	症状なしまたは頭部打撲・挫創・皮下血腫のみ	
	損傷の如何にかかわらず	