

頭部打撲で脳に異常をきたした場合
最初のサインは症状に現れます。



症状が出ていない状態でCT検査を
行って「異常なし」と判断されても、その
後に異常が現れる可能性があります。

遅れて現れる症状を見つけたら、その
時は検査が有効です。



頭部打撲から3日目までは、症状が
出ていないか、周囲の大人が観察を
継続しましょう。



**それぞれの時間帯で
項目をチェックしましょう**

打った時の状態と 今のお子さんの様子

打撲の時刻	今
(月 日 時)	(日 時)

衝撃の程度を確認しましょう。

- 落差は1m以下・打った床や壁は硬くない面でしたか？
- 打ったとき、痛そうで、すぐ泣きましたか？

お子さんの様子を
医師と一しょに
確認しましょう！



- 顔の表情と会話は、いつもどおりですか？
- 元気さはいつもどおりですか？
- 何度も吐いていませんか？

睡眠中の場合は

- 手かお腹を触ると、体を動かしますか？
- 抱っこしたとき、いつもどおり手足を動かしますか？

ちいさな子どもがおられる方へ

子 ども の
頭 部 打 撲
3 日 日 誌

今は無症状で、危険度も低い
…とはいえ、
あとから症状が出る
可能性がある

100%安心とは言えない場合の
観察記録

大阪府 健康医療部保健医療室

医療対策課救急・災害医療グループ

監修 : (一社)大阪小児科医会



要注意時間帯



打撲の時刻

当日 6 時間後

(月 日 時)

周囲の大人が
確認しましょう！



- 顔の表情と会話は、いつもどおりですか？
- 元気さはいつもどおりですか？
- 何度も吐いていませんか？

睡眠中は、家族が同じ部屋で眠り、

数時間毎に様子を見ましょう

- 手かお腹を触ると、体を動かしますか？
- 抱っこしたとき、いつもどおり手足を動かしますか？



要観察時間帯



2 日目 24 時間後

(月 日 時)

周囲の大人が
確認しましょう！



- 顔の表情と会話は、いつもどおりですか？
- 元気さはいつもどおりですか？
- 何度も吐いていませんか？

睡眠中は、家族が同じ部屋で眠り、

時々様子を見ましょう

- 手かお腹を触ると、体を動かしますか？
- 抱っこしたとき、いつもどおり手足を動かしますか？



念のため観察時間帯



3 日目 48 時間後

(月 日 時)

周囲の大人が
確認しましょう！



- 顔の表情と会話は、いつもどおりですか？
- 元気さはいつもどおりですか？
- 何度も吐いていませんか？

睡眠中は、家族が同じ部屋で眠り、

時々様子を見ましょう

- 手かお腹を触ると、体を動かしますか？
- 抱っこしたとき、いつもどおり手足を動かしますか？

1 つでも異常がある場合やその他気になる症状がある場合は、すぐに連絡してください。

▶ 子どもが急病になったとき

小児救急電話相談 (365 日 19 時～翌朝 8 時)

#8000 (固定電話 (プッシュ回線)・携帯電話)

06-6765-3650 (固定電話 (ダイヤル回線)・IP 電話)

▶ 救急車を呼ぶべきか迷ったとき

救急安心センターおおさか (365 日 24 時間)

#7119 (固定電話 (プッシュ回線)・携帯電話・PHS)

06-6582-7119 (固定電話 (ダイヤル回線)・IP 電話)

▶ その他 連絡先



異常がなければ、
今回はこれで一安心
3 日間に顔の表情や
顔色を見る習慣も
身につけよう！

その後症状が出る可能性は^{ゼロ}0 ではありませんが、
その他の事故等に遭遇する確率と変わりません。