

令和7年度 地域健康カルテ

藤井寺市版



目次

01 地域健康カルテの目的

02 地域健康カルテを有効に活用するために

03 寿命・死亡状況

平均寿命・健康寿命の推移
標準化死亡比（SMR）

04 人口・世帯数・就業関連情報

年齢階層別人口
世帯種別世帯数
就業関連情報

05 生活習慣

喫煙状況
運動習慣状況
食習慣状況
飲酒習慣状況
睡眠状況
健康への関心
社会参加状況
孤食状況(朝)
歯の平均本数

06 けんしん実施状況

特定健診受診率（市町村国保・協会けんぽ）
特定保健指導実施率（市町村国保）
がん検診受診率（胃、大腸、肺がん、子宮頸がん、乳がん）

07 特定健診・特定保健指導結果

特定健診受診者数 総数
メタボリックシンドローム判定状況
特定保健指導判定状況
特定保健指導利用状況
高血圧有病者
糖尿病有病者
脂質異常症有病者

08 寿命に関連する要因

09 地域健康カルテ（藤井寺市概要版）

01 地域健康カルテの目的

このカルテは、地域住民の健康状態や生活習慣に関するデータを体系的に整理し、自治体における健康増進施策の立案・評価に活用することを目的として作成しています。

住民の健康課題を可視化し、経年変化や他地域との比較を行うことで、保健事業の優先度を明確化し、効果的かつ効率的な施策展開につなげることを目指します。なお、本カルテに掲載されたすべてのデータを使用する必要はなく、施策や業務の目的に応じて、必要な部分を適宜ご活用ください。

また、地域健康カルテに掲載したデータ等について、各市町村の比較も容易にできる「大阪府健康データダッシュボード」を下記大阪府ホームページで公開していますので、あわせてご活用ください。

<https://www.pref.osaka.lg.jp/o100070/kenkozukuri/kenkoukarute/index.html>

02 地域健康カルテを有効に活用するために

✓ 課題の把握

健診データや生活習慣調査を用いて、地域特有の健康課題（高血圧、肥満、運動不足など）を明確にします。
性別や年度別、保険者別に分けて分析することで、重点的な対象群を把握できます。

✓ 施策立案の根拠資料

「なぜこの事業を行うのか」を住民や関係機関に説明する際のエビデンスとして活用できます。
また、健康日本21や大阪府の健康増進計画との整合性を確認するための基礎資料にもなります。

✓ 効果の検証・評価

事業実施前後で指標の変化を比較し、取組みの成果を定量的に評価できます。
継続的に情報を更新することで、改善の進捗や新たな健康課題を早期に把握できます。

✓ 地域間・部署間の共有

他市町村や各部署との情報共有を通じ、連携した健康施策の推進につながります。
教育、福祉、労働など多分野との協働を促進するための共通資料としても活用できます。


「匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)の分析項目について

- 地域健康カルテ掲載項目のうち、「05 生活習慣（喫煙状況、運動習慣状況、食習慣状況、飲酒習慣状況、睡眠状況）」、「07 特定健診・特定保健指導結果」では、「匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)」を使用しています。
- NDBデータの分析は、年齢層を5区分（35～39、40～49、50～59、60～69、70～74）に分け分析しましたが、本カルテには、50～59歳についての結果をまとめています。その他年代の結果については、「大阪府健康データダッシュボード」に掲載しています。
- NDBにデータが収載されていない等のために、算出できなかった項目は「NA」と表記しています。また、市町村別の結果はデータ数が少なくなる場合があり、地域の特性を必ずしも一般化したものではないことに注意が必要です。

03 寿命・死亡状況

< 男性 >


平均寿命の推移



府内18位
偏差値52.0

男性の平均寿命は府内中位に位置し、近年は横ばいからやや上昇傾向です。

健康寿命の推移




府内19位
偏差値51.9

男性の健康寿命は府内中位にあり、平均寿命との差は府内平均と同程度です。

平均寿命	H30	H31	R2	R3	R4	健康寿命	H30	H31	R2	R3	R4
全国	81.1	81.2	81.5	81.4	81.1	79.6	79.8	80.0	79.9	79.9	79.8
大阪府	80.7	80.9	81.1	80.8	80.4	79.0	79.2	79.3	79.1	79.1	78.7
藤井寺市	81.1	80.9	81.3	81.5	81.6	79.4	79.3	79.7	79.9	79.9	80.0

出典 国民健康保険団体連合会「KDBシステム」（大阪市を除く市町村）、厚生労働科学研究「健康寿命の算定プログラム」（大阪市、大阪府、全国）

標準化死亡比(SMR)



男性の標準化死亡比は項目によって差がみられ、死因別の特徴が異なる状況です。心疾患や腎不全、老衰、自殺は大阪府を上回る一方、脳血管疾患、肺炎、肝疾患は大阪府より大きく下回っています。

SMR	全死因	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	自殺
大阪府	106.6	107.0	117.0	87.9	125.3	134.1	115.5	79.5	95.1	103.8
藤井寺市	101.4	102.3	124.0	68.0	110.7	123.5	116.9	80.7	87.3	108.5
順位	18	20	26	10	16	32	27	26	18	30
偏差値	49.7	51.6	47.9	60.2	53.6	46.6	46.2	48.3	50.6	44.6

出典 厚労省「人口動態統計特殊報告」


* SMRは、国を基準（100）として数値が大きいほどその項目の死亡者が多いことを示します。

* 順位・偏差値は、市町村別に%の低い順に並べ算出しました。

03 寿命・死亡状況

<女性>


平均寿命の推移



府内23位
偏差値48.6

女性の平均寿命は府内中位に位置し、経年で小さな変動がみられます。

健康寿命の推移




府内18位
偏差値49.5

女性の健康寿命は府内中位に位置し、平均寿命との差は概ね府内平均と同程度です。

平均寿命	H30	H31	R2	R3	R4	健康寿命	H30	H31	R2	R3	R4
全国	87.1	87.2	87.5	87.4	87.1	全国	83.8	84.0	84.2	84.2	84.0
大阪府	87.0	87.4	87.7	87.4	86.9	大阪府	83.3	83.6	83.9	83.8	83.5
藤井寺市	87.0	87.4	87.6	87.8	87.4	藤井寺市	83.2	83.7	84.0	84.3	84.0

出典 国民健康保険団体連合会「KDBシステム」（大阪市を除く市町村）、厚生労働科学研究「健康寿命の算定プログラム」（大阪市、大阪府、全国）

標準化死亡比(SMR)



女性の標準化死亡比は100を上回る項目が複数みられ、死亡が多い状況が示されています。特に、不慮の事故による死亡は大阪府より大きく上回る一方、肝疾患、自殺は大阪府より大きく下回ります。

SMR	全死因	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	自殺
大阪府	102.7	103.6	112.0	79.8	129.8	124.5	121.1	86.4	93.5	112.5
藤井寺市	104.6	109.1	118.4	72.2	134.4	99.1	123.3	94.3	132.3	90.9
順位	24	38	19	11	21	6	32	35	43	4
偏差値	46.5	37.3	50.7	57.6	48.5	62.1	46.7	44.5	22.6	61.4

出典 厚労省「人口動態統計特殊報告」

* SMRは、国を基準（100）として数値が大きいほどその項目の死亡者が多いことを示します。

* 順位・偏差値は、市町村別に%の低い順に並べ算出しました。

04 人口・世帯数・就業関連情報

年齢階層別人口

項目名	総数, 人	割合, %	順位	偏差値	男性, 人	女性, 人
総人口	62,781	100	28	46.7	29,553	33,228
15歳未満	7,725	12.3	20	52.2	3,992	3,733
15～64歳	36,982	58.9	21	52.0	17,846	19,136
65歳以上	18,074	28.8	25	47.8	7,715	10,359

出典 総務省「国勢調査,人口等基本集計」

*総人口は市町村別の実人数、年齢階層別人口は市町村別に%の高い順に並べ、順位・偏差値を算出しています。

世帯種別世帯数

項目名	世帯数, 世帯	割合, %	順位	偏差値
一般世帯	27,773	100.0	28	46.9
核家族世帯	16,853	60.7	23	49.5
(再掲) 夫65歳以上、妻60以上の夫婦のみ	3,624	13.0	26	46.9
単独世帯	9,559	34.4	17	52.4
(再掲) 65歳以上の単独	4,061	14.6	8	57.0

出典 総務省「国勢調査,人口等基本集計」

*一般世帯は市町村別の実世帯数、世帯種別世帯は市町村別に%の高い順に並べ、順位・偏差値を算出しています。

就業関連情報

項目名	割合, %	順位	偏差値
就業者比率	95.4	30	47.2
高齢就業者割合 (65歳以上)	21.6	18	50.1
第2次産業及び第3次産業就業者比率	95.8	10	55.0
他市区町村への通勤者比率	65.2	11	58.7
他市区町村からの通勤者比率	37.2	23	47.6
最終学歴人口 (大学・大学院) 割合	16.8	15	50.0

出典 総務省「国勢調査,人口等基本集計」

*順位・偏差値は、市町村別に%の高い順に並べ算出しました。

*就業者比率は、就業者数を、就業者数と完全失業者数を合わせたもので除したものを示しています。

*高齢就業者割合は、65歳以上人口に占める就業者の割合を示しています。

- 年齢階層別人口を見ると、総人口は府内で中位に位置し、人口規模はやや小さめの市と言えます。15歳未満人口、15～64歳人口、65歳以上人口の割合はいずれも府内中位で、年齢構成は府内平均に近い状況といえます。
- 世帯種別世帯数を見ると、核家族世帯の割合は府内中位に位置し、標準的な水準といえます。一方、単独世帯の割合は府内中位ですがやや高く、特に65歳以上の単独世帯は府内上位に位置しており、高齢単身世帯が一定程度みられる構成となっています。
- 就業関連情報を見ると、就業者比率は低く、高齢就業者割合は中位に位置します。第2次・第3次産業就業者比率は府内で比較的高く、大学・大学院卒の割合は中位に位置しています。また、他市区町村への通勤者比率はやや高めです。

05 生活習慣

< 男性 (50~59歳) >



< 女性 (50~59歳) >





運動習慣 状況




食習慣 (朝食欠食) 状況



飲酒習慣 状況



睡眠 状況



出典 厚生労働省「匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)[2021年度特定健診分データ]」

* 保険者区分：組合は「健康保険組合・共済組合・国保組合」とし、その他は「市町村国保、協会けんぽ、組合」以外の保険者としてしました。

* 喫煙状況：喫煙者を「あり」としました。

* 運動習慣状況：30分以上の運動習慣ありを「あり」としました。

* 食習慣状況：朝食欠食週3回以上を「あり」としました。

* 飲酒習慣状況：毎日・時々と回答した人を「あり」としました。

* 睡眠状況：十分な休養ありと回答した人を「あり」としました。

05 生活習慣




<男性>	喫煙状況			運動習慣状況			食習慣状況 (朝食欠食)			飲酒習慣状況			睡眠状況		
	%	順位	偏差値	%	順位	偏差値	%	順位	偏差値	%	順位	偏差値	%	順位	偏差値
市町村国保	37.2	39	40.2	0.0	43	7.8	50.0	42	30.5	64.0	38	42.5	0.0	43	0.5
協会けんぽ	38.8	23	49.5	26.3	24	49.1	24.6	9	53.0	65.0	24	49.0	59.0	25	51.2
組合	29.0	36	39.6	33.7	5	59.0	16.4	22	51.3	67.2	20	49.1	65.6	4	65.1
その他	32.1	21	49.2	25.7	38	39.5	22.6	26	49.3	63.6	8	57.9	56.9	37	41.5

<女性>	喫煙状況			運動習慣状況			食習慣状況 (朝食欠食)			飲酒習慣状況			睡眠状況		
	%	順位	偏差値	%	順位	偏差値	%	順位	偏差値	%	順位	偏差値	%	順位	偏差値
市町村国保	15.1	32	42.6	NA	NA	NA	NA	NA	NA	35.6	11	56.0	NA	NA	NA
協会けんぽ	14.5	16	52.9	16.6	37	40.3	15.7	15	50.9	45.6	19	50.3	55.7	21	49.5
組合	5.8	25	49.6	11.8	42	31.4	10.1	12	54.3	47.2	32	43.7	54.4	16	53.2
その他	9.6	21	53.2	20.3	28	46.4	9.8	2	64.5	40.9	10	57.8	54.2	38	41.3

出典 厚生労働省「匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)[2021年度特定健診分データ]

*順位・偏差値は、喫煙状況・食習慣状況(朝食欠食)・飲酒習慣状況は、市町村別に%の低い順に並べ算出し、それ以外の項目は、市町村別に%の高い順に並べ算出しました。



藤井寺市	健康への関心			社会参加状況			孤食状況(朝)			歯の平均本数		
	%	順位	偏差値	%	順位	偏差値	%	順位	偏差値	本数	順位	偏差値
藤井寺市	96.0	19	56.6	52.0	20	50.1	36.0	36	44.0	24.3	4	60.6

出典 大阪府「令和4年度健康づくり実態調査報告書」

*順位・偏差値は、孤食(朝)は、市町村別に%の低い順に並べ算出し、それ以外の項目は、市町村別に%の高い順に並べ算出しました。

*健康への関心：関心がある、どちらかと言えば関心があるを「あり」としました。

*社会参加状況：参加していない以外の回答を「あり」としました。

*孤食状況(朝)：ほとんどない、同居している人がいないを「あり」としました。



05 生活習慣

男性（50～59歳）：2021年度 特定健診・特定保健指導結果

- 喫煙者割合は保険者間で差がみられ、市町村国保と協会けんぽで高く、組合では低い傾向です。府内順位では、協会けんぽとその他は中位、市町村国保と組合は下位に位置しています。
- 運動習慣のある人の割合は保険者間で差がみられ、組合で高く、その他で低くなっています。府内順位では、組合が上位、協会けんぽが中位、その他が下位に位置しています。
*市町村国保は本項目の回答欠損が多く、評価ができませんでした。
- 朝食欠食は保険者間で差がみられ、市町村国保で高く、組合では低い傾向です。府内順位では、協会けんぽが上位、組合とその他が中位、市町村国保は下位となっています。
- 飲酒習慣のある人の割合は保険者間で大きな差はみられませんでした。が、組合でやや高く、その他でやや低い傾向です。府内順位では、その他は上位、協会けんぽと組合は中位、市町村国保は下位となっています。
- 十分な休養がとれている人の割合は保険者間で差がみられ、組合で高く、その他で低い傾向です。府内順位では、組合は上位、協会けんぽは中位、その他は下位に位置しています。
*市町村国保は本項目の回答欠損が多く、評価ができませんでした。

女性（50～59歳）：2021年度 特定健診・特定保健指導結果

- 喫煙者割合は保険者間で差がみられ、市町村国保で高く、組合では低い傾向です。府内順位では、協会けんぽ、組合、その他は中位、市町村国保は下位に位置しています。
- 運動習慣のある人の割合は保険者間で差が見られ、その他で高く、組合で低い傾向です。府内順位では、その他は中位、協会けんぽと組合で下位に位置しています。
*市町村国保は本項目の回答が欠損しており、評価ができませんでした。
- 朝食欠食は保険者間で差が見られ、協会けんぽで高く、その他で低い傾向です。府内順位では、その他、組合で上位、協会けんぽは中位に位置しています。
*市町村国保は本項目の回答が欠損しており、評価ができませんでした。
- 飲酒習慣のある人の割合は保険者間で差がみられ、組合で高く、市町村国保では低い傾向です。府内順位では、市町村国保、その他は上位、協会けんぽは中位、組合は下位に位置しています。
- 十分な休養がとれている人の割合は保険者間で大きな差はみられず、概ね同様の割合でした。
*市町村国保は本項目の回答が欠損しており、評価ができませんでした。

男性・女性（20歳以上）：令和4年度 健康づくり実態調査結果

- 健康への関心があると回答した人の割合は比較的高い水準にあり、府内では中位に位置します。
- 社会参加をしている人の割合は府内で中位に位置しており、概ね平均的な水準となっています。
- 朝食時に孤食となる人の割合は府内で下位に位置しており、相対的に低い水準となっています。
- 歯の平均本数は府内で上位に位置しており、比較的高い水準にあります。

なお、本項目は大阪府健康づくり実態調査に基づく結果であり、回答者数は府全体で約2,800人と限られています。市町村別の結果は回答者数が少なくなる場合があり、地域の特性を必ずしも一般化したものではないことに注意が必要です。

06 けんしん実施状況

特定健診受診率

<市町村国保>

府内38位
偏差値36.0

府内2位
偏差値70.3

<協会けんぽ>




受診率	R3	R4	R5
大阪府 (国保)	29.2	30.8	31.5
市町村国保	49.1	48.8	48.0

受診率	R6
大阪府 (けんぽ)	57.1
市町村けんぽ	41.3

市町村国保の受診率は令和3年度から令和5年度にかけてやや低下傾向にありますが、府内では上位に位置しています。一方、協会けんぽ（被保険者事業所所在地別）は令和6年度で府内下位にあり、実施率も市町村国保より低い傾向です。

出典 厚労省「特定健診・特定保健指導について」（市町村国保）、協会けんぽ大阪支部「令和6年度特定健診受診率（被保険者事業所所在地別）」（協会けんぽ）
*順位・偏差値は、市町村別に%の高い順に並べ算出しました。

特定保健指導実施率



大阪府12位
偏差値55.5

実施率	R3	R4	R5
大阪府	29.2	18.1	17.7
市町村国保	36.8	35.2	35.1

特定保健指導実施率は令和3年度から令和5年度にかけてやや低下傾向にありますが、府内順位は上位に位置しています。

出典 厚労省「特定健診・特定保健指導について」（市町村国保）
*順位・偏差値は、市町村別に%の高い順に並べ算出しました。

がん検診受診率



受診率	胃がん	大腸がん	肺がん	子宮頸がん	乳がん
大阪府	3.4	7.1	6.9	12.9	10.6
藤井寺市	6.0	6.8	6.1	9.5	11.9
順位	10	24	25	39	26
偏差値	56.9	44.9	45.8	35.7	46.7

がん検診受診率は、胃がんは府内上位、大腸がん、肺がん、乳がんは中位、子宮頸がんは下位に位置しています。藤井寺市では、がん種別に府内順位のばらつきがみられ、全体としては上位から下位まで幅広く分布している状況です。

出典 大阪府「市町村の実施するがん検診の実績」
*順位・偏差値は、市町村別に%の高い順に並べ算出しました。



07 特定健診・特定保健指導結果

藤井寺市の特定健診受診者数（総数）は、13,000人

メタボリック シンドローム 判定状況



特定保健指導 判定状況



特定保健指導 利用状況



<男性>	メタボリックシンドローム判定状況			特定保健指導判定状況			特定保健指導利用状況		
	%	順位	偏差値	%	順位	偏差値	%	順位	偏差値
市町村国保	26.4	13	55.5	26.7	15	53.2	7.8	16	51.1
協会けんぽ	25.5	15	55.0	28.9	30	50.3	7.0	15	53.7
組合	20.0	3	65.0	24.1	11	57.0	7.9	35	43.3
その他	23.7	13	56.0	26.8	38	41.5	12.0	13	55.1

<女性>	メタボリックシンドローム判定状況			特定保健指導判定状況			特定保健指導利用状況		
	%	順位	偏差値	%	順位	偏差値	%	順位	偏差値
市町村国保	9.5	39	38.8	7.3	15	53.2	2.8	19	49.2
協会けんぽ	5.5	11	56.3	8.8	9	59.6	1.0	40	35.5
組合	6.9	38	40.2	10.5	35	42.2	2.2	26	48.4
その他	6.1	27	48.7	9.8	24	48.7	4.6	10	56.3

出典 厚生労働省「匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)[2021年度特定健診分データ]」
 *保険者区分：組合は「健康保険組合・共済組合・国保組合」とし、その他は「市町村国保、協会けんぽ、組合」以外の保険者としてしました。
 *順位・偏差値は、特定保健指導利用状況は、市町村別に%の高い順に並べ算出し、それ以外は、市町村別に%の低い順に並べ算出しました。

07 特定健診・特定保健指導結果

高血圧有病者





< 女性 (50~59歳) >



糖尿病有病者



脂質異常症有病者



<男性>	高血圧有病者			糖尿病有病者			脂質異常症有病者		
	%	順位	偏差値	%	順位	偏差値	%	順位	偏差値
市町村国保	0.0	1	74.3	10.1	24	49.2	50.4	7	57.4
協会けんぽ	31.6	20	52.6	9.6	11	54.0	50.8	12	53.8
組合	21.7	8	58.4	2.8	4	64.6	55.2	40	42.2
その他	22.4	12	55.3	7.9	6	56.9	52.2	36	45.2

<女性>	高血圧有病者			糖尿病有病者			脂質異常症有病者		
	%	順位	偏差値	%	順位	偏差値	%	順位	偏差値
市町村国保	0.0	1	69.6	5.1	37	40.7	45.4	33	45.8
協会けんぽ	19.5	25	49.1	4.1	26	46.0	45.8	38	43.4
組合	12.2	26	48.0	2.5	22	50.1	46.5	38	40.1
その他	10.9	4	62.9	7.2	40	32.6	41.9	26	47.8

出典 厚生労働省「匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)[2021年度特定健診分データ]

*保険者区分：組合は「健康保険組合・共済組合・国保組合」とし、その他は「市町村国保、協会けんぽ、組合」以外の保険者としてしました。

*順位・偏差値は、市町村別に%の低い順に並べ算出しました。

*高血圧有病者は、「収縮期140mmHg以上、または拡張期90mmHg以上または服薬者」として算出しました。

*糖尿病有病者は、「HbA1c6.5%以上または服薬者」として算出しました。

*脂質異常有病者は、「LDL-コレステロール140mg/dL以上、または中性脂肪150mg/dL以上、またはHDL-コレステロール40mg/dL未満、または服薬者」として算出しました。

07 特定健診・特定保健指導結果

男性（50～59歳）

- メタボリックシンドローム判定状況を見ると、保険者間で差がみられ、市町村国保で最も高く、協会けんぽ、その他、組合の順となっています。府内順位では、市町村国保、組合、その他は上位に位置し、協会けんぽは中位に位置しています。
- 特定保健指導判定状況では、いずれの保険者もメタボリックシンドローム判定状況から数%程度上昇がみられます。判定割合は、協会けんぽでやや高く、その他、市町村国保、組合の順となっています。府内順位では、組合は上位、市町村国保は中位、協会けんぽ、その他は下位に位置しています。
- 特定保健指導利用状況を見ると、保険者間で差がみられ、その他で最も高く、組合、市町村国保、協会けんぽの順となっています。府内順位では、その他は上位、市町村国保、協会けんぽは中位、組合は下位に位置しています。
- 高血圧有病者の状況を見ると、市町村国保では該当者はみられませんが、判定不能者が99%を占めています。このため、本結果は判定可能者のみを対象とした参考値にとどまります。市町村国保を除くと、協会けんぽで最も高く、その他、組合の順となっています。府内順位では、組合、その他は上位、協会けんぽは中位に位置しています。
- 糖尿病有病者の状況を見ると、保険者間で差がみられ、市町村国保で最も高く、協会けんぽ、その他、組合の順となっています。府内順位では、協会けんぽ、組合、その他は上位、市町村国保は中位に位置しています。
- 脂質異常症有病者の状況を見ると、組合で比較的高く、その他、協会けんぽ、市町村国保の順となっています。府内順位では、市町村国保、協会けんぽは上位、組合、その他は下位に位置しています。

女性（50～59歳）

- メタボリックシンドローム判定状況を見ると、保険者間で大きな差はみられませんが、市町村国保で比較的高く、組合、その他、協会けんぽの順となっています。府内順位では、協会けんぽは上位、その他は中位、市町村国保、組合は下位に位置しています。
- 特定保健指導判定状況を見ると、市町村国保のみメタボリックシンドローム判定状況よりやや低下していますが、その他の保険者ではいずれも数%程度の上昇がみられます。保険者間で大きな差はみられませんが、組合で比較的高く、その他、協会けんぽ、市町村国保の順となっています。府内順位では、協会けんぽは上位、市町村国保、その他は中位、組合は下位に位置しています。
- 特定保健指導利用状況を見ると、その他で最も高く、市町村国保、組合、協会けんぽの順となっています。府内順位では、その他は上位、市町村国保、組合は中位、協会けんぽは下位に位置しています。
- 高血圧有病者の状況を見ると、市町村国保では該当者はみられませんが、判定不能者が99%を占めています。このため、本結果は判定可能者のみを対象とした参考値にとどまります。市町村国保を除くと、協会けんぽで最も高く、組合、その他の順となっています。府内順位では、その他は上位、協会けんぽ、組合は中位に位置しています。
- 糖尿病有病者については、保険者間で大きな差はみられませんが、その他で比較的高く、市町村国保、協会けんぽ、組合の順となっています。府内順位では、協会けんぽ、組合は中位、市町村国保、その他は下位に位置しています。
- 脂質異常症有病者の状況を見ると、保険者間で大きな差はみられませんが、組合で比較的高く、協会けんぽ、市町村国保、その他の順となっています。府内順位では、その他は上位、市町村国保、協会けんぽ、組合はいずれも下位に位置しています。

<留意事項>

高血圧有病者：男女とも、市町村国保で、判定に必要な情報が不足している人が半数以上となっています。本結果は、判定が可能であった人を対象に集計したものであるため、参考程度の情報としてご覧ください。

糖尿病有病者：男女とも、協会けんぽ、組合、その他で、判定に必要な情報が不足している人が半数以上となっています。本結果は、判定が可能であった人を対象に集計したものであるため、参考程度の情報としてご覧ください。

08 寿命に関連する要因

寿命に関連する要因



TOPIC：平均寿命・健康寿命に関連する要因は？

大阪府では、令和7年度に大阪大学と連携して、市町村別の平均寿命および健康寿命に関連する要因分析を実施しました。

寿命には医療や生活習慣だけでなく、社会・環境・働き方など、多様な要素が複雑に関わります。そこで今回、幅広いデータセットをもとに平均寿命および健康寿命に影響のある指標を抽出し、各市町の特徴を踏まえてまとめました。

分析には、

- ① 社会・経済・人口などの全国統計（e-Stat 指標）
- ② 住民の健康行動・生活習慣の実態（大阪府健康づくり実態調査）
- ③ 健診と医療データ（NDB 特定健診関連指標）

の3種類の情報を使用しました。まず大阪府全体で平均寿命・健康寿命との関連が強い指標を機械学習という手法を用いてスクリーニングし、さらに一貫した関連・影響力があるものを抽出しました。その上で、各市町の実態に当てはめ、あなたの市町で特に影響が大きい要因を上位3つずつ選んでいます。これにより、「この市ではどの生活特性・社会的背景が寿命に強く影響しているのか」、「重点的に取り組むべき要因はどれか」を市町ごとに把握しやすくしました。

< 指標の説明 >

影響度：影響の強さを50を基準とするスコアで整理しています。数値が50を超える場合、その市町では、該当項目が寿命を伸ばす方向に働いている度合いが大きいと解釈できます。反対に、数値が50を下回る場合、該当項目が寿命を短くする方向に働きやすいと読み取れます。

本市町村がどの要因の影響を受けやすいのか、施策検討の際の手がかりとしてご活用ください。

* 「孤食の少なさ（朝食）」および「地域コミュニティへの参加あり」は、05生活習慣と08寿命に関連する要因で偏差値の算出方法が異なります。また、08では、回答にスコアを付与し市町村別平均点から偏差値を算出しています。一方、05では、社会参加の有無（該当者割合％）を基に偏差値を算出しています。そのため、同一項目でも順位および偏差値が一致しない場合があります。

* 「08 寿命に関連する要因」におけるデータの出典等の詳細については、下記大阪府HPに掲載している「健康寿命・平均寿命に関する要因分析報告書」を参照ください。


<https://www.pref.osaka.lg.jp/o100070/kenkozukuri/kenkoukarute/index.html>

藤井寺市	偏差値			影響度（男性）		影響度（女性）	
	男女	男性	女性	平均寿命	健康寿命	平均寿命	健康寿命
65歳以上世帯員の非単独世帯の割合	43.1	-	-	-	45.7	-	47.9
最終学歴人口（大学・大学院）の割合	50.0	-	-	50.0	50.0	50.0	50.0
孤食の少なさ（朝食）	59.7	-	-	-	54.8	-	52.1
地域コミュニティへの参加あり	68.5	-	-	54.2	-	53.9	-
健診受診頻度の多さ	59.1	-	-	54.1	53.1	52.4	52.2
運動制限なしの割合	56.0	-	-	52.7	52.6	51.3	51.3
国保現在喫煙 非該当者	-	40.3	42.7	48.8	48.7	44.9	45.7
寿命順位（R4年度）	-	-	-	18	19	23	18

藤井寺市では、他の市町村に比べて、孤食（朝食）が少ないこと、地域コミュニティへの参加が多いこと、健診受診頻度の多さや運動制限なしの割合が高いことが、寿命を長くする方向に関連しています。一方、65歳以上世帯員の非単独世帯の割合が低いこと、国保の現在喫煙非該当者の割合が低いことが寿命を短くする方向に関連しています。

09 地域健康カルテ（藤井寺市概要版）

人口・世帯数・就業関連情報





年齢階層別人口を見ると、藤井寺市の総人口は府内中位に位置し、人口規模はやや小さめの市です。

15歳未満人口、15～64歳人口、65歳以上人口の割合のいずれも府内中位に位置しています。


全体として、年齢構成は府内平均に近く、やや若い世代が多い状況です。

平均寿命・健康寿命



平均寿命・健康寿命は、男女ともに、府内中位に位置します。

男性は平均寿命・健康寿命ともに、近年緩やかな上昇傾向がみられます。平均寿命と健康寿命の差は、府内平均と概ね同程度です。



女性の平均寿命・健康寿命ともに、経年で小さな変動がみられます。平均寿命と健康寿命の差は、府内平均と概ね同程度です。

標準化死亡比(SMR)

< 男性 >



藤井寺市の標準化死亡比をみると、男性は項目によって差がみられ、死因別に特徴が異なる状況です。大阪府を上回る項目も複数ある一方、脳血管疾患、肺炎、肝疾患は大阪府を大きく下回ります。

< 女性 >



女性は100を上回る項目が複数みられ、死亡が多い状況が示されています。大阪府を上回る項目は複数ありますが、特に、不慮の事故は大阪府を大きく上回ります。一方、肝疾患や自殺など、大阪府を大きく下回る項目もあります。

09 地域健康カルテ（藤井寺市概要版）

生活習慣 健診等

- 藤井寺市の50～59歳の生活習慣は、項目・保険者でばらつきがあります。喫煙は男女とも市町村国保・協会けんぽで高く、府内順位は男性で市町村国保・組合が下位、女性で市町村国保が下位です。運動習慣は男性で組合が府内上位に位置する一方、協会けんぽ・その他で低く、その他は府内下位です。女性は組合で低く、協会けんぽ・組合はいずれも府内下位です。朝食欠食は男性で市町村国保が最も高く府内下位ですが、女性は協会けんぽで高いものの、府内順位はいずれの保険者も上～中位です。飲酒は男性で保険者間差は小さい一方、市町村国保は府内下位で、女性は組合が高く府内下位です。睡眠は男女ともその他で低めて、府内下位に位置します。
- 健康づくり実態調査では、健康への関心、社会参加状況は府内中位、朝食時の孤食は府内下位です。歯の平均本数は比較的高い水準です。
- 市町村国保の特定健診受診率は府内上位ですが、協会けんぽは府内下位です。市町村国保の特定保健指導実施率は近年わずかに低下傾向ですが、府内上位です。
- がん検診受診率は、胃がんが府内上位、大腸がん・肺がん・乳がんが府内中位、子宮頸がんが府内下位にあります。がん種によりばらつきがみられます。
- 特定健診結果では、女性のメタボ判定は市町村国保・組合で相対的に高く、府内下位に位置します。特定保健指導判定は、男性では協会けんぽ・その他、女性では組合で高めで、いずれも府内下位です。特定保健指導の利用状況は、男性は組合、女性は協会けんぽで低く、府内下位に位置します。
- 有病者割合をみると、高血圧は男女とも協会けんぽで相対的に高いものの、全保険者で上～中位です。糖尿病は、男性は市町村国保、女性は市町村国保・その他で高く、男性は全体として上～中位にある一方、女性は市町村国保・その他で府内下位です。脂質異常症は、男性では組合・その他、女性では市町村国保・協会けんぽ・組合で高く、いずれも府内下位に位置します。

課題の まとめ



協会けんぽの特定健診受診率が府内下位に位置します。



女性は欠損が多く評価に制約がある一方、男性の市町村国保では喫煙・朝食欠食が多く、生活習慣面の改善余地がありそうです。



脂質異常症有病者割合が、男女ともに、複数の保険者で府内下位です。

*本内容は、令和7年度健康カルテ掲載情報に基づく想定課題であり、追加情報により課題が変化する可能性があります。

検討 ポイント



協会けんぽ加入者の受診率向上に向け、事業所・健診機関と連携した案内の工夫・受診機会の拡充が望まれます。



男性の市町村国保を主対象に、禁煙支援・朝食欠食改善・健康に配慮した飲酒に関する周知と支援を強化することが望まれます。



健診結果のフィードバックを活用し、脂質異常症の受療状況を確認のうえ、未受療者への受診勧奨・保健指導を強化することが望まれます。

令和7年度地域健康カルテ

発行 大阪府健康医療部健康推進室健康づくり課
(業務受託者) 大阪大学医学系研究科公衆衛生学

